

COSECHA DEL CULTIVO DE PAPA

- Papa semilla
- Papa consumo



Tiempo de cosecha

Depende de:

- Finalidad de la producción
 - Papa semilla certificada
 - Papa consumo
- Altitud sobre el nivel del mar de la parcela
- Variedad cultivada

En el caso de Icta Frit:

De 120 a 150 días para semilla y

De 150 a 180 días para consumo



Actividades en la cosecha

En la cosecha se reconocen dos actividades importantes:

1. Defoliación
2. Clasificación del tubérculo



Defoliación

Actividad que consiste en quitar las hojas y tallos de la planta.

Debe de realizarse de 15 a 20 días antes de la cosecha.

A nuestro alcance están dos métodos.

- Manual
- Químico



Objetivo de la defoliación en la producción de semilla

Control de áfidos

Al destruir el follaje indirectamente se controla áfidos transmisores de virus.

Control del tamaño de semilla

Se debe realizar un muestreo continuo a partir de los 105 días después de la siembra. Cuando el 80% de los tubérculos haya alcanzado el tamaño deseado se realiza la defoliación.

Acelerar la maduración

Es necesario que el pericarpio (piel), esté bien fijado para evitar lastimar la semilla.



Clasificación del tubérculo para semilla

ICTA FRIT

Para semilla se debe trabajar los siguientes tamaños:

Primera: 4 a 8 Cm.

Segunda: 8 a 12 Cm.



Clasificación del tubérculo para consumo

Para consumo los tamaños son los siguientes:

Papa granel: 4 a 6 onzas

Papa súper: 6 a 8 onzas

