

INSUMOS A UTILIZAR EN LA PRODUCCIÓN



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



Fintrac



SERVICIOS DE
POST COSECHA



ASOCUCH

ETIQUETAS

Sumamente Peligroso	 MUY TOXICO
Muy Peligroso	 TOXICO
Moderadamente Peligroso	 NOCIVO
Poco Peligroso	CUIDADO
Productos que normalmente no ofrecen Peligro	CUIDADO



EQUIPO DE PROTECCIÓN

Mascarilla


Camisa de protección

Guantes largos

Mandil

Pantalón de protección

Botas largas



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



Fintrac



SERVICIOS DE
POST COSECHA



ASOCUCH

VERANGO



INGREDIENTE ACTIVO: (Floupyram)

MODO DE ACCIÓN: Sistémico

INTERVALO DE APLICACIÓN: Siembra y 50 días.


COMPATIBILIDAD: Emesto Flux

DÓSIS: 1 copa por bomba de 16 lts.

CONTROL: Nemátodos



EMESTO FLUX



INGREDIENTE ACTIVO: Penflufen y Imidacloprid

MODO DE ACCIÓN: Sistémico

INTERVALO DE APLICACIÓN: 1 vez

COMPATIBILIDAD: Verango

DÓSIS: 4 copas por bomba de 16 lts.

CONTROL: Gallina ciega, gusano alambre.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



DECIS 10 EC



INGREDIENTE ACTIVO: Deltamethrin

MODO DE ACCIÓN: Contacto, ingestión.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 8 días

COMPATIBILIDAD: Con fungicidas e insecticidas, foliares.

DOSIS: 8 cc por bomba de 16 lts.

CONTROL: Gusano de la hoja, Oruga, Falso medidor



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



MONARCA

INGREDIENTE ACTIVO: Thiacloprid


MODO DE ACCIÓN: Sistémico, contacto, ingestión.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 8 días

COMPATIBILIDAD: Con fungicidas e insecticidas, foliares.

DÓSIS: 10 cc por bomba de 16 lts.

CONTROL: Trips, pulgón, mosca blanca



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



REVUS



INGREDIENTE ACTIVO: Mandipropamid y Clorothalonil.

MODO DE ACCIÓN: Contacto, Traslaminar

INTERVALO DE APLICACIÓN: 8 días

COMPATIBILIDAD: Con fungicidas e insecticidas, foliares.

DÓSIS: 1 copa por bomba de 16 lts.


CONTROL: Preventivo contra tizón tardío.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



CONSENTO



INGREDIENTE ACTIVO: Propamocard

MODO DE ACCIÓN: Contacto, Traslaminar

INTERVALO DE APLICACIÓN: 8 Días

COMPATIBILIDAD: Con fungicidas e insecticidas, foliares.

DÓSIS: 1 copa por bomba de 16 lts.

CONTROL: Preventivo y curativo contra tizones.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



NUTRICIÓN

NUTRICIÓN FOLIAR



NUTRICIÓN RADICULAR



ADHERENTE



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

