

INFORMACIÓN DE CONTACTO

 3011-6958 * 4639-8801
5326-0962

 Cuchusemillas

 Meseta De Los Cuchumatanes
Chiantla, Huehuetenango



CATÁLOGO

Semilla de papa certificada




CUCHUSEMILLAS
— SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA —



CUCHUSEMILLAS
— SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA —



PLANTA ICTA FRIT



TUBÉRCULO ICTA FRIT



CORTEZA ICTA FRIT



BROTE ICTA FRIT

ICTA FRIT

CARACTERÍSTICAS

ICTA FRIT


Altura de planta (cm)	80-90
Días a floración	70-130
Color de la flor	rosada
Días a madurez fisiológica	125-170
Color de la piel	Blanca
Color de la pulpa	Blanca
Forma del tubérculo	oblonga alargada
Rendimiento (t/ha)	20-60 toneladas por hectárea.
Altitud de siembra (msnm)	1500-3600
Tizón tardío	Tolerante
Uso potencial	Fritura casera, ensalada, papas hervidas, enlatada y textura pastosa.
Aspecto Culinario	Presenta solido solubles totales de 17.3%, porcentaje de almidón 11.6% por su forma hace una variedad adecuada para fritura por su forma alargada.



CUCHUSEMILLAS
— SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA —



PLANTACIÓN TOLLOCAN



TÚBERCULO TOLLOCAN



FRUTO TOLLOCAN



SEMILLA TOLLOCAN

TOLLOCAN

CARACTERÍSTICAS

TOLLOCAN


Altura de planta (cm)	70-75
Días a floración	55-60
Color de la flor	Blanca
Días a madurez fisiológica	110-115
Color de la piel	Crema
Color de la pulpa	Crema
Forma del tubérculo	Oblongo
Tubérculo por planta	20-25
Rendimiento (t/ha)	25-35
Altitud de siembra (msnm)	1500-3600
Tizón tardío	Tolerante
Uso potencial	Papas hervidas, puré, de regular a buena para papalinas, de textura cerosa, y muy susceptible en su vida de anaquel.
Aspecto Culinario	Presenta solido solubles totales de 18.2%, porcentaje de almidón 12.6% por su forma hace una variedad con potencial para fritura



CUCHUSEMILLAS
— SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA —




LOMAN PLANTA



LOMAN



HOJA LOMAN



SEMILLA LOMAN

LOMAN

CARACTERÍSTICAS

LOMAN


Altura de planta (cm)	60-65
Días a floración	No produce flor
Color de la flor	No produce flor
Días a madurez fisiológica	80-90
Color de la piel	Crema
Color de la pulpa	Crema
Forma del tubérculo	Oblongo alargado
Tubérculo por planta	10-15
Rendimiento (t/ha)	20-30
Altitud de siembra (msnm)	1500-3600
Tizón tardío	Susceptible
Uso potencial	papas hervidas, puré, de textura cerosa, y muy buena en su vida de anaquel.
Aspecto Culinario	Presenta solido solubles totales de 18.8%, porcentaje de almidón 13.2% por su forma hace una variedad adecuada para fritura por su forma alargada.



CUCHUSEMILLAS
— SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA —




**PLANTA
ICTA PALESTINA**



**TÚBERCULO
ICTA PALESTINA**



CORTEZA ICTA PALESTINA



SEMILLA ICTA PALESTINA

**ICTA
PALESTINA**

CARACTERÍSTICAS

ICTA PALESTINA


Altura de planta (cm)	60-65
Días a floración	90
Color de la flor	lila pálido
Días a madurez fisiológica	105-120
Color de la piel	Crema clara
Color de la pulpa	Blanca
Forma del tubérculo	Oblongo alargado
Tubérculo por planta	12-15
Rendimiento (t/ha)	30
Altitud de siembra (msnm)	1500-3500
Tizón tardío	Susceptible
Uso potencial	Papa especializada para elaborar bastones fritos o papas a la francesa, también para consumo en fresco.
Aspecto Culinario	Presenta sólido solubles totales de 24.0%, azúcares reductores 1.21% característica importante que ayuda a que los bastones fritos no cambien de una coloración oscura durante el proceso de fritura.



CUCHUSEMILLAS
— SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA —



PLANTA ICTA LOMAN ROJA



PAPA ICTA LOMAN ROJA



ICTA LOMAN ROJA



CORTEZA ICTA LOMAN ROJA

ICTA LOMAN ROJA

CARACTERÍSTICAS

ICTA LOMAN ROJA


Altura de planta (cm)	60-65
Días a floración	70
Color de la flor	Violeta
Días a madurez fisiológica	105
Color de la piel	Roja
Color de la pulpa	Crema
Forma del tubérculo	ovalada-alargada
Tubérculo por planta	10-12
Rendimiento (t/ha)	30 toneladas por hectárea, en suelos con infestación de nematodos (al menos un quiste por centímetro cúbico de suelo).
Altitud de siembra (msnm)	1500-3700
Nematodos	Tolerante al nematodo del quiste (Globodera rostochiensis)
Tizón tardío	
Tolerante	
Uso potencial	Ensalada, papas hervidas y textura harinosa.
Aspecto Culinario	Presenta solido solubles totales de 17.3%, porcentaje de almidón 11.6% por su forma hace una variedad adecuada para fritura por su forma alargada.




CUCHUSEMILLAS
— SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA —



**ROANTAQUEEPIRE
LEE**



**TUBÉRCULO QUE ANFIT
LEE**



**PAPORTAZQUELANRLEE
(INTERIOR)**



BROQUECHAEPIRE

**JACQUELINE
LEE**

CARACTERÍSTICAS

JACQUELINE LEE

Altura de planta (cm)	60-70
Días a floración	No produce flor
Color de la flor	No produce flor
Días a madurez fisiológica	100-105
Color de la piel	Crema
Color de la pulpa	Crema
Forma del tubérculo	Oblongo
Tubérculo por planta	15-20
Rendimiento (t/ha)	25-40
Altitud de siembra (msnm)	1500-3100
Tizón tardío	Alta tolerancia
Uso potencial	Papas hervidas, puré, de regular a buena para papalinas, de textura cerosa.
Aspecto Culinario	Presenta muy buena calidad culinaria y una piel muy fina.